


Pracovní list k seriálu Birdwatching

5. Jak je poznáte

A. Poznávací znaky

Pojmenuj výrazné znaky na ptačím těle (dopiš je k linkám, které na ně míří).
Porovnej dva podobné druhy a urči, čím se liší.


1. Žluna zelená



2. Sýkora koňadra




Sýkora modřinka




Liší se těmito znaky:

3. Racek stříbřitý (zimní šat dospělých)




Racek bělohlavý (zimní šat dospělých)



Liší se těmito znaky:

4. Králíček obecný




Králíček ohnivý




Liší se těmito znaky:

5. Slavík modráček tundrový




Slavík modráček středoevropský




Liší se těmito znaky:

6. Vrabec domácí



Vrabec polní



Liší se těmito znaky:

B. Siluety a prostředí

1. Naši snadno zaměnitelní synantropní ptáci (ti, co žijí v lidských sídlech).

Poznej druhy v letu podle siluet a spočítej, kolik na obloze nad statkem a paneláky létá:

Rorýsů obecných

Vlaštovek obecných

Jiříček obecných



2. Kde žijí dravci?

Níže vidíš siluety tří našich dravců seřazené podle velikosti. Víš, v jakém prostředí (biotopu) se s nimi můžeš setkat? Zkus jednotlivé siluety překreslit nad správné prostředí (pole, rybník a les).


1. orel mořský



2. káně lesní



3. poštolka obecná



A) pole


B) rybník

C) les

Správné řešení

A. Poznávací znaky

1. Žluna zelená



2. Sýkora koňadra a sýkora modřinka




Liší se těmito znaky: modřinka má modrou čepičku, koňadra černou, modřinka má bílý nadoční proužek, koňadra má černý pruh na hrudi

3. Racek stříbřitý a racek bělohlavý – oba druhy u nás protahují a zimují




Liší se těmito znaky: racek bělohlavý má čistě bílou hlavu, stříbřitý má hnědošedé žihání na hlavě, bělohlavý má na horním zobáku černou skvrnku, červená skvrna na spodním zobáku je menší než u stříbřitého

4. Králíček obecný a králíček ohnivý



Liší se těmito znaky: králíček obecný má bílý oční kroužek a žlutou chocholku, králíček ohnivý má černý a bílý nadoční proužek a černý oční proužek a uzdičku, chocholku má více oranžovou než králíček obecný

5. Slavík modráček tundrový (u nás pouze v Krkonoších) a slavík modráček střeoevropský (na zbytku území)



Liší se těmito znaky: Slavík modráček tundrový má v modré náprsence rezavou skvrnu, někdy zvanou hvězda


6. Vrabec domácí a vrabec polní



Liší se těmito znaky: Vrabec polní má na líci tmavě hnědou skvrnku, vrabec domácí má šedé líce bez skvrny, polní má hnědou hlavičku a pouze malou černou skvrnu na bradě, domácí má šedý vrch hlavy (čepičku) a velkou černou skvrnu na hrudi (náprsenku)


B. Siluety a prostředí

1. Na obloze nad statkem a paneláky létá celkem 33 ptáků.



Rorýs má silná dlouhá a zašpičatělá křídla. **Vlaštovka** má vidličnatě vykrojený dlouhý ocas do písmene „V“. **Jiříčka** má kratší, ne tolik vykrojený ocas, křídla nejsou tolik do špičky, je ze všech tří druhů nejmenší.

2. Nad polem zastihneme poštolku obecnou třepetat se na místě **(3A)**, nad rybníkem můžeme pozorovat orla mořského **(1B)** a nad lesem létá káně lesní **(2C)**.



Více her na stránkách České společnosti ornitologické <http://hry.birds.cz/>